

Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide

Beiheft Nr. 2 (März 2002)

aus der Regionalstelle 8 für die floristische Kartierung Niedersachsens

Hrsg.: Dr. Thomas Kaiser, Landschaftsarchitekt, Am Amtshof 18, 29355 Beedenbostel, Tel. 05145/2575, Fax 05145/280864

Thomas Kaiser

Naturkundliche Bibliographie, Folge 9

Naturkundliche Bibliographie, Folge 9

Thomas Kaiser

Um allen Kartierern und Kartierern einen Überblick über die naturkundliche Erforschung des Bereiches der Regionalstelle 8 zu geben, sollen an dieser Stelle Veröffentlichungen sowie unveröffentlichte Manuskripte, Gutachten, Diplom- und Projektarbeiten mit Bezug zu diesem Raum zusammengestellt werden. Für Hinweise auf weitere Arbeiten wäre der Verfasser sehr dankbar.

Die Folge 9 der Naturkundlichen Bibliographie schließt an die in Heft 9 der Floristischen Notizen veröffentlichte Zusammenstellung der im Jahre 1998 erschienenen Arbeiten an.

1998 (Fortsetzung)

- ARBEITSGEMEINSCHAFT ZUR REINHALTUNG DER WESER (1998): Wiederansiedlung von Wanderfischen im Wesereinzugsgebiet. Überprüfung der Laichhabitate im Wesereinzugsgebiet. Teil 1. - 61 S.; Hildesheim.
- HÜBNER, G., KLOSE, G. (1998): Erfolgskontrolle der Renaturierung eines Baches in der Lüneburger Heide anhand der Ephemeroptera, Plecoptera und Trichoptera. - *Lauterbornia* **34**: 53-66; Dinkelscherben.
- MEYER, L., KRUSE, S., KOLSTER, H., BRUNKEN, H. (1998): Die Fischfauna im Einzugsgebiet der mittleren Ilmenau. - *Fischökologie aktuell* **11**: 11-31; Petersberg.
- MEYER, L., PELZ, G.R. (1998): Radiotelemetrische Untersuchungen an Äschen *Thymallus thymallus* (L.) in der Ilmenau (Niedersachsen). - *Fischökologie* **11**: 21-34; Petersberg.
- MÜLLER, J., GEBHARDT, R. (1998): Die Vegetation der Holmer Teiche (Lüneburger Heide) – Entwicklung und Vielfalt in einer extensiv genutzten Kulturlandschaft. – *Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg* **41**: 75-101; Lüneburg.
- MÜLLER, R., HANSTEIN, U. (1998): Flugsande, Binnendünen und der Strandhafer (*Ammophila arenaria* (L.) LK.) in der Lüneburger Heide. – *Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg* **41**: 161-184; Lüneburg.
- MÜTTERLEIN, J. (1998): Vegetationskundliche und tierökologische Untersuchungen mit einer Analyse der Landschaftsentwicklung im Naturschutzgebiet „Gagelstrauchfläche bei Räderloh“ (Landkreis Gifhorn). - Diplomarbeit an der Universität-Gesamthochschule Kassel, Fachbereich Landschaftsplanung, 161 S.; Kassel.
- MUSSMANN, F. (1998): Die Schleiereule ist im Landkreis Soltau-Fallingb. fast überall wieder heimisch. - *Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb.* **5**: 61-74; Soltau.
- NIEDERSÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM (1998/99): Gebietsvorschläge zur abschließenden Umsetzung der FFH-Richtlinie der EU (92/43/EWG) in Niedersachsen. – Hannover.
- OELKE, H., REITHER, H. (1998): Der Weißstorch (*Ciconia ciconia*) im Kreis Peine (Niedersachsen, BRD) im 20. Jahrhundert. - *Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens* **51** (4): 171-238; Peine.
- OSTERMANN, U. (1998): Grundwasserentnahme für landwirtschaftliche Beregnung aus Sicht einer Unteren Wasserbehörde. - *Mitteilungen aus der NNA* **9** (3): 47-50; Schneverdingen.

- PACKHÄUSER, W., SCHMIDT, F.-U. (1998): Bestandsentwicklung der Schleiereule *Tyto alba* im Alt-kreis Soltau 1998 - 1996. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **5**: 57-60; Soltau.
- PUDWILL, R. (1998): Fluß- und Quelljungfern (Anisoptera: Gomphidae und Cordulegastridae) im Raum Gifhorn (Ost-Niedersachsen). - Braunschweiger naturkundliche Schriften **5** (3): 541-549; Braunschweig.
- REUSCH, H., BRINKMANN, R. (1998): Zur Kenntnis der Präsenz der Trichoptera-Arten in limnischen Biotoptypen des norddeutschen Tieflandes. - Lauterbornia **34**: 91-103; Dinkelscherben.
- REUSCH, H., SIEBERT, M., KLIMA, M. (1998): Larven von Schnepfenfliegen (Diptera: Athericidae) in Fließgewässern der Lüneburger Heide und angrenzender Regionen im Niedersächsischen Tiefland. - Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **41**: 117-127; Lüneburg.
- RODE, M.W. (1998): Sukzessionen in Heidegebieten. - Naturschutz und Landschaftsplanung **30** (8/9): 285-290; Stuttgart.
- RÖHRS, U., SCHMIDT, F.-U. (1998): Analyse von Schleiereulengewöllen 1994/1995 aus dem Landkreis Soltau-Fallingbostel. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **5**: 53-56; Soltau.
- ROSENTHAL, G., HILDEBRANDT, J., ZÖCKLER, C., HENGSTENBERG, M., MOSSAKOWSKI, D., LAKOMY, W., BURFEINDT, I. (1998): Feuchtgrünland in Norddeutschland - Ökologie, Zustand, Schutzkonzepte. - Angewandte Landschaftsökologie **15**: 336 S.; Bonn - Bad Godesberg.
- RUND, C. (1998): Unterhaltungsrahmenpläne in der Praxis - Fallbeispiele aus der Lüneburger Heide. - NNA-Berichte **11** (1): 12-18; Schneverdingen.
- SCHEPKER, H., KOWARIK, I. (1998): Invasive North American Blueberry Hybrids (*Vaccinium corymbosum* x *angustifolium*) in Northern Germany. - In: STARFINGER, U., EDWARDS, K., KOWARIK, I., WILLIAMSON, M. (Hrsg.): Plant Invasions: Ecological Mechanisms and Human Responses. - S. 253-260; Leiden.
- SCHMIDT, F.-U. (1998a): Die Seidenhäuser der Gespinstmotten (Fam. *Yponomeutidae*). - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **5**: 19-24; Soltau.
- SCHMIDT, F.-U. (1998b): Die Vogelwelt der Polder der Stärkefabrik bei Wietendorf - eine kommentierte Artenliste. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **5**: 25-52; Soltau.
- SCHMIDT, F.-U. (1998c): Vogelkundliche Besonderheiten im Landkreis Soltau-Fallingbostel 1997. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **5**: 75-92; Soltau.
- SCHMIDT, F.-U. (1998d): Raubwürger *Lanius excubitor* speißt Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **5**: 93-96; Soltau.
- SCHMIDT, F.-U., FAUST, G., SCHWENKE, S. (1998): Brutbestand von Elster *Pica pica* und Aaskrähe *Corvus c. corone* in Soltau (Lüneburger Heide / Niedersachsen 1996/97. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **5**: 1-18; Soltau.
- SCHUMACHER, J. (1998): Heuschrecken in verschiedenen Lebensraumtypen auf den ehemals militärisch genutzten Übungsflächen Rote Fläche 1 und 2 im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. - Diplomarbeit, Fachhochschule Osnabrück, 108 S.; Osnabrück. [unveröffentlicht]
- SIEBER, M. (1998): Vegetationskundliche Untersuchungen im oberen Böhmetal unter besonderer Berücksichtigung des Grünlandes und der bachbegleitenden Erlenwälder. - Magisterarbeit, Universität Lüneburg. [unveröffentlicht]
- STRASBURGER, K. (1998): Ansammlungen von Rauhußbussarden *Buteo lagopus* im unteren Allertal im Januar/Februar 1997. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **5**: 97-101; Soltau.
- STUBBE, A. (1998): Aus Wald wird (wieder) Heide - Die Waldumwandlungen im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. - Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **41**: 185-196; Lüneburg.
- SUHLING, F., SCHÜTTE, C., LEIPELT, K.-G. (1998): Erneute Schlupfnachweise von *Aeshna affinis* Vander Linden im niedersächsischen Drömling (Anisoptera: Aeshnidae). - Libellula **17** (3/4): 253; Mönchengladbach.
- TÄUBER, T. (1998a): Entwicklung von Flora und Vegetation des ehemaligen Panzerübungsgeländes im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. - Natur und Landschaft **73** (12): 523-530; Stuttgart.

- TÄUBER, T. (1998b): Neu- und Wiederfunde von Arten der Zwergbinsen-Gesellschaften in Niedersachsen. Teil 1: Landkreise Soltau-Fallingb. (SFA), Celle (CE) und Gifhorn (GF). – Floristische Rundbriefe **32** (1): 74-80; Bochum.
- TÖNNIESSEN, J. (1998): „Aus Rot wird Grün“ - Die Renaturierung des ehemaligen britischen Panzerübungsgeländes im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide schreitet voran. - Naturschutz- und Naturparke **168**: 2-10; Bispingen.
- VEREIN NATURSCHUTZPARK E.V. (1998): Die „Roten Flächen“ werden grün. - Natur und Landschaft **73** (12): 530-532; Stuttgart.
- WEBER, H.E. (1998): Wichtigste Nachträge zur Gattung *Rubus* in Deutschland als Ergänzung zur Flora von HEGI 1995. – Floristische Rundbriefe **32** (1): 57-73; Bochum.
- WOHLGEMUTH, J.-O. (1998): Die Wilde Tulpe (*Tulipa sylvestris* L.) in Niedersachsen - Verbreitung und Bestandssituation einer alten Zierpflanze. - Diplomarbeit, Institut für Landschaftspflege und Naturschutz, Universität Hannover, 114 S. + Anhang; Hannover. [unveröffentlicht]
- WÖLDECKE, K. (1998): Die Großpilze Niedersachsens und Bremens. – Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen **39**: 536 S.; Hannover.

1999

- ABOLING, S. (1999): „Milchschemel“ und „Frohsinn“ – *Euphrasia stricta* auf dem Aller-Grünland bei Jeversen im Landkreis Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **7**: 2-4; Beedenb. bostel.
- ALTMÜLLER, R. (1999): Gewässerunterhaltung - eine Ursache für unnatürliche Sandfrachten in Tieflandbächen. - In: DVWK und Gewässerdirektion Südl. Oberrhein/Hochrhein (Hrsg.): Unterhaltung und Entwicklung von Flachlandgewässern. - Tagungsband zum Workshop am 8. und 9. Juni 1999 in Achern/Ortenaukreis: III/1-III/19; Offenburg.
- BEUG, J. (1999): Veränderungen der Hydrophytenvegetation in Stillgewässern des unteren Allertals von 1981 – 1995. – Naturkundliche Beiträge Soltau Fallingb. **6**: 1-18; Soltau.
- BLANKE, D. (1999): Fischotter im Aufwind? – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **19** (2): 112-115; Hildesheim.
- BORGGRÄFE, K., KÖLSCH, O. (1999): Situation und Perspektiven der Grünlandbewirtschaftung in der Ise-Niederung. - Natur- und Kulturlandschaft **3**: 274-281; Höxter/Jena.
- BORKOWSKY, O. (1999): Subspontanes Vorkommen und Ausbreitung seltener Gefäßpflanzen im Stadtgebiet Gifhorns. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **7**: 4-10; Beedenbostel.
- BURKART, W., IBOLD, F. (1999): Brut des Bienenfressers (*Merops apiaster*) 1998 im Landkreis Rotenburg (Wümme). - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **31** (1): 51-52; Goslar.
- CLAUSNITZER, H.-J. (1999): Bedeutung von Primärhabitaten für die mitteleuropäische Fauna. - Naturschutz und Landschaftsplanung **31** (9): 261-266; Stuttgart.
- DEGEN, A. (1999): Ornithologischer Jahresbericht für Niedersachsen und Bremen 1997. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **31** (2): 87-103; Goslar.
- DELFS, J. (1999a): Waldmast im Südosten der Lüneburger Heide. – Forst und Holz **54** (10): 305-311; Alfeld.
- DELFS, J. (1999b): Schweinemast im Wald - Mastnutzung in den Ämtern Gifhorn, Knesebeck, Isenhagen und Bodenteich. - Schriftenreihe des Landkreises Gifhorn **16**: 62 S.; Gifhorn.
- DELFS, J. (1999c): Plaggenhieb und Streunutzung in der Lüneburger Heide. - Forst und Holz **54** (24): 762-767; Alfeld.
- DENKER, E., LUCKER, T., BÜTHE, A. (1999): Untersuchungen zur Schadstoffbelastung von Rotaugen (*Rutilus rutilus*) in der Ise als mögliche Nahrungsgrundlage des Fischotters (*Lutra lutra*), Ost-Niedersachsen. - Braunschweiger naturkundliche Schriften **5** (4): 935-946; Braunschweig.
- DETHLEFS, M. (1999): Kostbarkeiten in Natur und Landschaft. - In: SCHIEBE, H.-P. (Hrsg.): Hermannsburg in der Südheide. - S. 104-122; Hermannsburg.

- DIECKMANN, U. (1999): Von der Naturlandschaft zur Kulturlandschaft. - In: Jahrbuch 2000 Landkreis Soltau-Fallingb. - S. 190-211; Soltau.
- FAASCH, H. (1999): Gewässergütebericht -Untersuchung 1998 und Darstellung der Ergebnisse aus 40 Jahren in der Region Braunschweig. - Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz - Betriebsstelle Süd, 38 + 42 S.; Braunschweig.
- GARLEFF, K. (1999): Zur Frage der Entstehung des Totengrundes bei Wilsede. - Naturschutz- und Naturparke **175**: 27-29; Bispingen.
- GARVE, E. (1999a): Neu auftretende Blütenpflanzen an salzhaltigen Rückstandshalden in Niedersachsen. - Braunschweiger Geobotanische Arbeiten **6**: 171-191; Braunschweig.
- GARVE, E. (1999b): Zur Flora der Kalihalden in der Region um Hannover. - Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover **141**: 197-218; Hannover.
- GEFFCKEN, H. (1999): Heide, Wald und Bienen. - In: Jahrbuch 2000 Landkreis Soltau-Fallingb. - S. 95-116; Soltau.
- GRIESE, F. (1999): Waldsukzession auf Dünensanden im niedersächsischen Tiefland am Beispiel des Naturwaldes Ehrhorner Dünen. - NUA-Seminarbericht **4**: 80-90; Recklinghausen.
- GRIMMEL, E. (1999): Spur eines Meteoriten? - Naturschutz- und Naturparke **172**: 18-21; Bispingen.
- HAASE, P., REUSCH, H. (1999): „Aktualisiertes und kommentiertes Artenverzeichnis der Eintags- und Steinfliegen (Ephemeroptera, Plecoptera) Niedersachsens. - Lauterbornia **37**: 177-186; Dinkelscherben.
- HEINKEN, T., ZIPPEL, E. (1999): Die Sand-Kiefernwälder (Dicrano-Pinion) im norddeutschen Tiefland: syntaxonomische, standörtliche und geographische Gliederung. - Tuexenia **10**: 55-106; Göttingen.
- HÖXTER, W. (1999): Beitrag zur Kenntnis der Rhithrogena-Arten (Ephemeroptera, Heptageniidae) in Niedersachsen. - Braunschweiger naturkundliche Schriften **5** (4): 841-847; Braunschweig.
- KAISER, T. (1999a): Konzeptioneller Aufbau eines Pflege- und Entwicklungsplanes - dargestellt am Beispiel des Naturschutzgroßprojektes „Lüneburger Heide“. - Angewandte Landschaftsökologie **18**: 7-27; Bonn - Bad Godesberg.
- KAISER, T. (1999b): Bewertungen im Rahmen eines Pflege- und Entwicklungsplanes - dargestellt am Beispiel des Naturschutzgroßprojektes „Lüneburger Heide“. - Angewandte Landschaftsökologie **18**: 55-68; Bonn - Bad Godesberg.
- KAISER, T. (1999c): Naturkundliche Bibliographie, Folge 6. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **7**: 16-19; Beedenb. -
- KAISER, T. (1999d): Die potentielle natürliche Vegetation des Großraumes Celle auf der Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1:50.000 (BÜK 50). - NNA-Berichte **12** (2): 66-77; Schneverdingen.
- KAISER, T. (1999e): Flora der Salzstandorte des Landkreises Celle in Vergangenheit und Gegenwart. - Braunschweiger Geobotanische Arbeiten **6**: 237-244; Braunschweig.
- KAISER, T., LANGBEHN, H. (1999): Floristische Kurzmitteilungen aus dem Landkreis Celle 1998. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **7**: 10-16; Beedenb. -
- KÜSTER, H. (1999): Die nacheiszeitliche Waldentwicklung in Norddeutschland und deren mögliche Beeinflussung durch die Fauna. - NNA-Berichte **12** (2): 83-87; Schneverdingen.
- LÜPKE, B.V., HAUSKELLER-BULLERJAHN, K. (1999): Kahlschlagfreier Waldbau: Wird die Eiche an den Rand gedrängt? - Forst und Holz **54** (18): 563-568; Alfeld.
- LÜTKEPOHL, M. (1999a): Naturschutz mit der Säge. - Naturschutz- und Naturparke **172**: 36-37; Bispingen.
- LÜTKEPOHL, M. (1999b): Die Vogelwelt kulturhistorischer Wälder in der Lüneburger Heide. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **31**: 133-134; Goslar.
- LÜTKEPOHL, M., KAISER, T. (1999): Die Heidelandschaft im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. - In: Jahrbuch 2000 Landkreis Soltau-Fallingb. - S. 233-248; Soltau.
- LÜTKEPOHL, M., TÖNNIESSEN, J. (1999): Naturschutzpark Lüneburger Heide, 2. Aufl. - 224 S.; Hamburg.

- MEY, H., PRESSEL, H., SCHILLING, A., SCHUPP, D. (1999): GIS-Daten zum Naturschutz in Niedersachsen. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **19** (2): 79-86; Hildesheim.
- NAEDER, K. (1999): Zuordnung von Baum- und Straucharten der potentiell natürlichen Vegetation zu den Standortstypenuntergruppen des pleistozänen Flachlandes. – 265 S. + Anhang; Wolfenbüttel.
- PANEK, N. (1999): Nationalpark-Zukunft in Deutschland – einige kritische Anmerkungen und Thesen. – Natur und Landschaft **74** (6): 266-272; Stuttgart.
- PETERS, J. (1999): Zum Brutvorkommen des Roten Milans (*Milvus milvus*) im Landkreis Celle im Jahr 1987. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **31** (1): 39-43; Goslar.
- POHL, D. (1999a): Bibliographie über die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Lüneburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen **33** (3): 205 S.; Hildesheim.
- POHL, D. (1999b): Die ältesten Naturschutzgebiete in Niedersachsen - eine chronologische Zusammenstellung. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **19** (3): 163-169; Hildesheim.
- POTT, R. (1999): Lüneburger Heide. Wendlung und Nationalpark Mittleres Elbtal. - 256 S.; Stuttgart.
- PUDWILL, R. (1999a): Nachweise der Wespenspinne *Argiope bruennichi* (Arachnida: Araneae) im Landkreis Gifhorn (Ost-Niedersachsen). – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **52** (2): 42; Peine.
- PUDWILL, R. (1999b): Zur Verbreitung der Streifenwanze *Graphosoma lineatum* (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) im Raum Gifhorn (Ost-Niedersachsen. – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **52** (2): 59-60; Peine.
- REICHEL, B. (1999): Der Kolkrabe - Gegenwart und Vergangenheit. - In: Jahrbuch 2000 Landkreis Soltau-Fallingb. - S. 117-123; Soltau.
- REITHER, H., REITHER, G. (1999): Weißstorch-Beobachtungen 1999 im Vergleich mit 1998 im Regierungsbezirk Braunschweig. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **52** (3): 111-112; Peine.
- RETTICH, H. (1999): Anfänge und Entwicklung des amtlichen Naturschutzes in Niedersachsen: Ereignisse - Daten - Fakten. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **19** (3): 130-160; Hildesheim.
- RIECKMANN, K. (1999): Die Obstwiese am Düşorner „Wedden“. - In: Jahrbuch 2000 Landkreis Soltau-Fallingb. - S. 142-145; Soltau.
- RÖHRS, U., SCHMIDT, F.-U. (1999): Die Brutvogelgemeinschaften von zwei Hofanlagen in der Lüneburger Heide (Landkreis Rotenburg/Soltau-Fallingb.). - Naturkundliche Beiträge Soltau Fallingb. **6**: 71-86; Soltau.
- SABARTH, A. (1999): Bedeutung von Substrat und Versandung für die Verteilung des Makrozoobenthos in naturnahen Heidebächen. - Dissertation, Technische Universität Braunschweig, Gemeinsame Naturwissenschaftliche Fakultät, 97 S.; Braunschweig.
- SCHMIDT, F.-U. (1999a): Anmerkungen zur Bestandsentwicklung und aktuellen Situation von Haubenlerche *Galerida cristata*, Ortolan *Emberiza hortulana* und Grauammer *Miliaria calandra* im Landkreis Soltau-Fallingb. (ca. 1850 – 1998). - Naturkundliche Beiträge Soltau Fallingb. **6**: 19-34; Soltau.
- SCHMIDT, F.-U. (1999b): Die Brutvogelgemeinschaft einer Kleingartenkolonie bei Soltau 1997. - Naturkundliche Beiträge Soltau Fallingb. **6**: 49-52; Soltau.
- SCHMIDT, F.-U. (1999c): Beobachtung von Rabenvögeln und Großmöwen auf der Deponie Hillern 1997 – 1998 (Landkreis Soltau-Fallingb./Niedersachsen. - Naturkundliche Beiträge Soltau Fallingb. **6**: 53-70; Soltau.
- SCHMIDT, F.-U. (1999d): Vogelkundliche Besonderheiten im Landkreis Soltau-Fallingb. 1998. - Naturkundliche Beiträge Soltau Fallingb. **6**: 87-104; Soltau.
- SCHMIDT, F.-U. (1999e): Brutvogelbestandsaufnahme einer Feldflur bei Woltem im Jahr 1998 (Landkreis Soltau-Fallingb./Niedersachsen. - Naturkundliche Beiträge Soltau Fallingb. **6**: 105-116; Soltau.
- SCHMIDT, F.-U. (1999f): „Die Vogelwelt der Heidewälder“. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **31** (2): 131-137; Goslar.

- SCHMIDT, W. (1999): Die Bodenvegetation als Indikator für die biologische Mannigfaltigkeit von Wäldern - Beispiele aus Naturwaldreservaten und Wirtschaftswäldern. - Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **29**: 133-143; Heidelberg.
- SCHUMACHER, J., PRÜTER, J., ZUCCHI, H. (1999a): Erstmaliges Auftreten des Pilzes *Entomophaga grylli* bei der Gefleckten Keulenschrecke *Myrmeleotettix maculatus* (THUNBERG, 1815) (Saltatoria: Caelifera: Acrididae). - Articulata **14** (1): 7-9; Erlangen.
- SCHUMACHER, J., PRÜTER, J., ZUCCHI, H. (1999b): Wiederfund der Westlichen Beißschrecke *Platycleis albopunctata* (GOEZE, 1778) im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ (Saltatoria: Ensifera: Tettigoniidae). - Articulata **14** (1): 11-15; Erlangen.
- SCHUMACHER, J., PRÜTER, J., ZUCCHI, H. (1999c): Heuschrecken (Saltatoria) auf den ehemals militärisch genutzten Übungsflächen Rote Fläche 1 und 2 im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. - Articulata **14** (2): 85-95; Erlangen.
- SCHÜTTE, C., OTT, C., HÜNKEN, A. (1999): Vergleich der Larvalentwicklung von *Calopteryx splendens* (HARRIS, 1782) und *Calopteryx virgo* (L., 1758) (Odonata: Calopterygidae) in zwei Fließgewässern in Niedersachsen. - Braunschweiger naturkundliche Schriften **5** (4): 857-867; Braunschweig.
- SELLHEIM, P. (1999): Leitlinie für eine ökologisch orientierte Entwicklungsplanung der Aller von Celle bis Verden. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **19** (2): 105-107; Hildesheim.
- SIEBERT, M., WANGEMANN-BUDDE, M. (1999): Verbreitungsatlas der Fließgewässerfauna. - Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz - Betriebsstelle Verden, 372 S.; Verden.
- STEINBORN, W. (1999a): Der Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus* L. im Landkreis Soltau-Fallingb. - Naturkundliche Beiträge Soltau Fallingb. **6**: 117-128; Soltau.
- STEINBORN, W. (1999b): Niederdeutsche Tiernamen. - Naturkundliche Beiträge Soltau Fallingb. **6**: 129-135; Soltau.
- STEINBORN, W. (1999c): Biber in der Heide? - In: Jahrbuch 2000 Landkreis Soltau-Fallingb. - S. 124-134; Soltau.
- STRASBURGER, K., SCHMIDT, F.-U. (1999): Auswertung der Ringablesung beim Weißstorch *Ciconia ciconia* L. im Landkreis Soltau-Fallingb. - Naturkundliche Beiträge Soltau Fallingb. **6**: 35-48; Soltau.
- SÜDBECK, P., OLDEKOP, W. (1999): Zum Brutbestand des Rothalstauers *Podiceps grisegena* in Niedersachsen 1990 - 1998. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **31** (1): 1-10; Goslar.
- SUHLING, F., KRATZ, R. (1999): Veränderungen der Heuschrecken-Lebensgemeinschaft (Saltatoria) norddeutschen Niedermoor-Grünlandes nach einem lang andauernden Überstau. - Braunschweiger naturkundliche Schriften **5** (4): 869-881; Braunschweig.
- TÄUBER, T., GARVE, E. (1999): Das Acker-Gipskraut (*Gypsophila muralis* L.) in Niedersachsen und Bremen: Verbreitung, Vergesellschaftung und Gefährdung. - Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Bremen **44** (2-3): 417-435; Bremen.
- THIESS, A. (1999): Das Naturschutzprojekt Lutter. - Broschüre, Landkreis Celle, 20 S.; Celle.
- TÖNNIESSEN, J. (1999): Die Saline und das Holz. - Naturschutz- und Naturparke **172**: 25-31; Bispingen.
- WESTPHAL, C. (1999): Der Naturwald „Ehrhorner Dünen“ und die angrenzenden Kiefernbestände im Wirtschaftswald. - NUA-Seminarbericht **4**: 295-297; Recklinghausen.
- WILLENBOCKEL, A. (1999): Auf den Spuren der Gletscher im Eiszeitlandkreis Soltau-Fallingb. - In: Jahrbuch 2000 Landkreis Soltau-Fallingb. - S. 175-189; Soltau.
- ZACHARIAS, D. (1999): Erarbeitung von Grundlagen für aktuelle Karten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation (PNV) in Niedersachsen auf Basis der bodenkundlichen Übersichtskarte 1:50.000 (BÜK 50). - NNA-Berichte **12** (2): 62-65; Schneverdingen.
- ZUCCHI, H. (1999): Nachweis der Streifenwanze *Graphosoma lineatum* (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) in Sunder (Ldkrs. Celle). - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **52** (4): 165-166; Peine.

2000

- ALTMÜLLER, R., DETTMER, R. (2000): Erste Erfolge beim Arten- und Biotopschutz für die Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera* L.) in Niedersachsen. - *Natur und Landschaft* **75** (9/10): 384-388; Stuttgart.
- BACH, L. (2000): Auswirkungen von Revitalisierungsmaßnahmen an dem Heidebach Ise auf dessen Libellenfauna. - *Angewandte Landschaftsökologie* **37**: 267-270; Bonn - Bad Godesberg.
- BÖCKMANN, T., DRÖGE, H.-H., THIEL, B., HÜSING, F. (2000): Konzept für die Betriebskarte mit Strukturelementen - Beispiel aus der Niedersächsischen Landesforstverwaltung. - *Forst und Holz* **55** (5): 145-148; Alfeld.
- BURKART, W., LOPAU, W. (2000): Libellen im Landkreis Rotenburg (Wümme). - *Naturkundliche Schriftenreihe der Stiftung Naturschutz im Landkreis Rotenburg (Wümme)* **2**: 175 S.; Rotenburg (Wümme).
- DETHLEFS, M., KAISER, T. (2000): Kehren die Bartflechten zurück? – Beobachtungen aus der Südheide. - *Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens* **53** (1): 22-29; Peine.
- FAASCH, H., GUHL, B., SCHWÄGLER, U. (2000): Gewässergüte 1986-2000 in Südniedersachsen. - *Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz - Betriebsstelle Süd*. 95 S.; Braunschweig.
- GARVE, E., GARVE, V. (2000): Halophyten an Kalihalden in Deutschland und Frankreich (Elsass). - *Tuexenia* **20**: 375-417; Göttingen.
- GREIN, G. (2000): Zur Verbreitung der Heuschrecken (Saltatoria) in Niedersachsen und Bremen. - *Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen* **20** (2): 74-112; Hildesheim.
- HAMANN, K. (2000a): Wald- und Forstgeschichte - Am Beispiel des niedersächsischen Landkreises Harburg. - *Naturschutz- und Naturparke* **176**: 24-33; Bispingen.
- HAMANN, K. (2000b): Wald- und Forstgeschichte - Am Beispiel des niedersächsischen Landkreises Harburg / II. Teil. - *Naturschutz- und Naturparke* **177**: 12-16; Bispingen.
- HAMANN, K. (2000c): Wald- und Forstgeschichte - Am Beispiel des niedersächsischen Landkreises Harburg / III. Teil. - *Naturschutz- und Naturparke* **178**: 20-27; Bispingen.
- HAMANN, K. (2000d): Wald- und Forstgeschichte - Am Beispiel des niedersächsischen Landkreises Harburg / IV. Teil. - *Naturschutz- und Naturparke* **179**: 17-19; Bispingen.
- HANSTEIN, U. (2000): Vom Geheimnis des Alterns - am Beispiel nordwestdeutscher Tiefland-Buchenwälder. - *Forst und Holz* **55** (15): 477-480; Alfeld.
- HÄRDLE, W., DIERSSEN, K., ROMAHN, K.S. (2000): Nachträge zur Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Naturschutzgebietes „Lüneburger Heide“. - *Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide* **8**: 15-19; Beedenbostel.
- HARTMANN, G., HABERMANN, M., NIEMEYER, H. (2000): Waldschutzsituation 1999/2000 in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. - *Forst und Holz* **55** (8): 243-247; Alfeld
- HEMMER, C. (2000): Hilfe für Schleiereulen *Tyto alba* SCOP. in der Samtgemeinde Meinersen (Landkreis Gifhorn) durch ein erhöhtes Nistkastenangebot. - *Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens* **53** (1): 15-19; Peine.
- HÜBNER, G. (2000): Renaturierung von Schmäler Aue und Sprengbach. - *Naturschutz- und Naturparke* **176**: 39-41; Bispingen.
- HÜNKEN, A., SCHÜTTE, C. (2000): Schwebstoffbelastung von Fließgewässern im Weser-Aller-Flachland. - *Braunschweiger Naturkundliche Schriften* **6** (1): 227-238; Braunschweig.
- KAISER, T. (2000): Naturkundliche Bibliographie, Folge 7. - *Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide* **8**: 20-23; Beedenbostel.
- KAISER, T., ELLERMANN, G., LANGBEHN, H., TIMMERMANN, E. (2000): Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Celle. - *Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide* **8**: 2-15; Beedenbostel.
- KANTH, I. (2000): „Feinschmecker-Krähen“ in Celle. - *Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens* **53** (4): 209-211; Peine.

- KLEYER, M., KRATZ, R., LUTZE, G., SCHRÖDER, B. (2000): Habitatmodelle für Tierarten: Entwicklung, Methoden und Perspektiven für die Anwendung. - Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz **8** (4): 177-194; Jena.
- KÖLSCH, O., BORGGRAFE, K., LUCKER, T. (2000): Revitalisierung von Flußlandschaften - biotische, dynamische und kommunikative Aspekte. - Angewandte Landschaftsökologie **37**: 301-303; Bonn - Bad Godesberg.
- LOBENSTEIN, U. (2000): Zur Schmetterlingsfauna des mittleren Niedersachsens. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **53** (4): 133-179; Peine.
- KOOPMANN, A. (2000): An Naturschutzziele und historischer Heidebauernwirtschaft orientierte Landwirtschaft auf Sandböden. Fallstudie Landschaftspflegehof Tütsberg (Lüneburger Heide). - Dissertation, Universität Göttingen, 247 S.; Göttingen.
- LUCKER, T., BORGGRAFE, K., KÖLSCH, O. (2000): Chancen und Grenzen der Revitalisierung von Fließgewässern durch Reduzierung der Gewässerunterhaltung am Beispiel der Ise, einem typischen kleinen Fluß der nordwestdeutschen Agrarlandschaft. - Angewandte Landschaftsökologie **37**: 311-314; Bonn - Bad Godesberg.
- LÜTKEPOHL, M. (2000): Heidebauernkultur und Schafhaltung in der Lüneburger Heide. - Schriften der Museen der Stadt Delmenhorst, Reihe Fabrikmuseum Nordwolle Band **4** (1): 86-99; Oldenburg.
- LÜTKEPOHL, M., PRÜTER, J. (2000): Die Vögel im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. - 199 S.; Bremen.
- MELTER, J., SCHREIBER, M. (2000): Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **32** (Sonderheft): 318 S.; Goslar.
- MEYER, P., UNKRIG, W., GRIESE, F. (2000): Dynamik der Buche (*Fagus sylvatica* L.) in nordwestdeutschen Naturwäldern. - Forst und Holz **55** (15): 470-477; Alfeld.
- MUELLER, R. (2000): Fließgewässerbericht 2000. - Stadt Celle, Tiefbauamt, 103 S. + Anhang; Celle.
- MÜLLER, O., SCHÜTTE, C., ARTMEYER, C., BURBACH, K., GRAND, D., KERN, D., LEIPELT, K.G., MARTENS, A., PETZOLD, F., SUHLING, F., WEIHRAUCH, F., WERZINGER, J., WERZINGER, S. (2000): Entwicklungsdauer von *Gomphus vulgatissimus*: Einfluss von Gewässertyp und Klima (Odonata: Gomphidae). - Libellula **19** (3/4): 175-198; Mönchengladbach.
- PUDWILL, R. (2000a): Die epiphytische Flechtenflora im Raum Gifhorn (Ost-Niedersachsen). - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **53** (2): 61-67; Peine.
- PUDWILL, R. (2000b): Die Makrophytenvegetation des Allersees und des Tankumsees (Ost-Niedersachsen) - unter besonderer Berücksichtigung der Armelechteralgen (Charales). - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **53** (2): 68-71; Peine.
- PUDWILL, R. (2000c): Die Neubesiedlung und Populationsdynamik der Libellenfauna eines neu angelegten Moorweihers (Odonata). - Braunschweiger Naturkundliche Schriften **6** (1): 57-67; Braunschweig.
- SCHMIDT, L., SPRICK, P., HAHLBOHM, H.-H., WILLERS, J., FORCKE, T. (2000): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover. - Braunschweiger Naturkundliche Schriften **6** (1): 103-122; Braunschweig.
- SCHMIDT, W., WICHMANN, I. (2000): Zur Sukzession von Waldbrandflächen in der Lüneburger Heide. - Forst und Holz **55** (15): 481-487; Alfeld.
- SCHRÖDER, B., RICHTER, O. (2000): Are habitat models transferable in space and time? - Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz **8** (4): 195-205; Jena.
- STUBBE, A. (2000): Die Entwicklung der Brandfläche in der Wümmeheide. - Naturschutz- und Naturparke **179**: 32-36; Schneverdingen.
- STUKE, J.-H., WOLFF, D., HONDELMANN, P., MALEC, F. (2000): Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen und Bremen 3. - Braunschweiger Naturkundliche Schriften **6** (1): 139-147; Braunschweig.
- TÄUBER, T. (2000): Zwergbinsen-Gesellschaften (*Isoeto-Nanojuncetea*) in Niedersachsen. - 238 S.; Göttingen.

- WENDT, P., SCHMIDT, W. (2000): Auswirkungen von Kalkungsmaßnahmen auf die Vegetation von Kiefernwäldern in der Lüneburger Heide (NW-Deutschland). - *Forst und Holz* **55** (1): 9-14; Alfeld.
- WESTPHAL, C. (2000): Theoretische Gedanken und beispielhafte Untersuchungen zur Naturnähe von Wäldern im Staatlichen Forstamt Sellhorn (Naturschutzgebiet Lüneburger Heide). - Dissertation, Universität Lüneburg, 213 S. + Anh.; Lüneburg.
- WOLFF, D. (2000): Die deutschen Raubfliegen (Diptera, Asilidae) in den Sammlungen norddeutscher Museen III. - *Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens* **53** (4): 180-191; Peine.

2001

- ALFRED TOEPFER AKADEMIE FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.) (2001): Naturschutzgebiet Lüneburger Heide - Böhme-Zeitung und Winsener Anzeiger Sonderseiten 1999/2000. - 21 S.; Schneverdingen.
- ALTMÜLLER, R., BUDDENSIEK, V., DETTMER, R., UTERMARK, W., WÄCHTLER, K. (2001): Nachruf. Wolf Dietrich Bischoff. - In: Wasserwirtschaftsamt Hof & Albert-Ludwigs-Universität Freiburg: Die Flussperlmuschel in Europa - Bestandssituation und Schutzmaßnahmen. - S. 209-214; Freiburg - Hof.
- ALTMÜLLER, R., DETTMER, R. (2001): Erhaltungsmaßnahmen für die Flussperlmuschel in der Lüneburger Heide: Ein Situationsbericht. - In: Wasserwirtschaftsamt Hof & Albert-Ludwigs-Universität Freiburg: Die Flussperlmuschel in Europa - Bestandssituation und Schutzmaßnahmen. - S. 146-156; Freiburg - Hof.
- CLAUSNITZER, H.-J. (2001a): Späte Geburtstermine bei Kreuzottern (*Vipera berus* L.) in der Südheide. - *Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens* **54** (1): 8-13; Peine.
- CLAUSNITZER, H.-J. (2001b): Auswirkung von Naturschutzmaßnahmen auf Libellen und Lurche: Ökologische Verbesserung an Bächen durch Rückbau von Teichen. - *Natur und Landschaft* **76** (4): 145-151; Stuttgart.
- FEDER, J. (2001): 15 Jahre floristische Kartierung im Gebiet von Schwarmstedt (Landkreis Soltau-Fallingb. B.). - *Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide* **9**: 25-30; Beedenb. B.
- FEDER, J. (2001): Ergänzung zum Vorkommen von *Poa bulbosa* in Lüneburg. - *Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide* **9**: 33; Beedenb. B.
- FISCHER, M. (2001): Zur Heuschreckenfauna (Insecta: Saltatoria) im Großen Moor bei Gifhorn (SO-Niedersachsen). - *Braunschweiger Naturkundliche Schriften* **6** (2): 281-291; Braunschweig.
- FRANKE, F., KIRCHBERGER, U. (2001): Ungewöhnliche, aber bewährte Allianz: Sieben anerkannte Naturschutzverbände arbeiten auf Landkreisebene in der Verbandsbeteiligung eng zusammen. - *Natur und Landschaft* **76** (6): 270-272; Stuttgart.
- FREUND, H. (2001): Das Eem-Interglazial als Beispiel einer vom Menschen unbeeinflussten Waldentwicklung in Mitteleuropa. - *Natur- und Kulturlandschaft* **4**: 29-35; Höxter.
- GARVE, E. (2001a): Steinbrech-Felsenelke (*Petrorhagia saxifraga*) in der Lüneburger Heide. - *Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide* **9**: 23-24; Beedenb. B.
- GARVE, E. (2001b): Mehrjähriger Aufenthalt eines Virginiauhus (*Bubo virginianus*) in der Lüneburger Heide. - *Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen* **33** (1): 63-64; Goslar.
- GERKEN, R., LANGBEHN, H. (2001): Die aktuelle Verbreitung der Gattung *Alchemilla* im Landkreis Celle. - *Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide* **9**: 12-15; Beedenb. B.
- GRABOW, K., FAASCH, H., SIEBERT, M. (2001): Zum Vorkommen des Lappenmoostierchens *Lophopus crystallinus* (PALLAS 1768) (Bryozoa) in Niedersachsen. - *Lauterbornia* **40**: 71-77; Dinkelscherben.
- GRÖLL, W. (2001): Gedenksteine im Naturschutzpark Lüneburger Heide. - *Naturschutz- und Naturparke* **182**: 10-25; Schneverdingen.

- GROTTIAN, T. (2001): Wasser, Wiesen, Wischenmaker. Von Suderburg in alle Welt: Bewässerungswiesen der Lüneburger Heide. - Museumsdorf Hösseringen, Materialien zum Museumsbesuch **21**: 44 S.; Suderburg.
- HAMANN, K. (2001): Wald- und Forstgeschichte. Am Beispiel des niedersächsischen Landkreises Harburg. V. und letzter Teil. - Naturschutz- und Naturparke **182**: 25-33; Schneverdingen.
- HÄRDTLE, W., OHEIMB, G.V., WESTPHAL, C. (2001): Vergleichende Untersuchungen zur Struktur und Vegetation von Natur- und Wirtschaftswäldern des Tieflandes auf der Grundlage räumlich expliziter Vegetationsmodelle. - Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **13**: 183-196; Hannover.
- HÄRDTLE, W., WEDI-PUMPE, S. (2001): Zur Bestandesentwicklung von *Crassula helmsii* in den Holmer Teichen (Lüneburger Heide). - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **9**: 30-33; Beedenbostel.
- HOPPE, A. (2001): Verbreitung und Vegetation der Bewässerungswiesen Nordwestdeutschlands. - Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **13**: 247-250; Hannover.
- KAISER, T. (2001): Naturkundliche Bibliographie, Folge 8. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **9**: 33-34; Beedenbostel.
- KAISER, T., GERKEN, R. (2001): Überblick zum Gesamtsippenbestand der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Celle, Stand Februar 2001. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **9**: 20-22; Beedenbostel.
- KATENHUSEN, O. (2001): Die Ausbreitung von Pflanzen durch Hochwasser in norddeutschen Flusslandschaften. - Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz **9** (4): 225-236; Jena.
- KRATZ, R., PFADENHAUER, J. (2001): Ökosystemmanagement für Niedermoore. - 317 S.; Stuttgart.
- LANGBEHN, H., GERKEN, R. (2001): Floristische Neu- und Wiederfunde 2000 im Landkreis Celle. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **9**: 15-19; Beedenbostel.
- LÜTKEPOHL, M. (2001): Die Entwicklung von Sandheiden, Moorheiden und Ackerbrachen unter dem Einfluß der Beweidung durch Heidschnucken. - Natur- und Kulturlandschaft **4**: 217-223; Höxter/Jena.
- MADSACK, G., LANGBEHN, H. (2001): Heideweiherpflanzen im Entenfang Boye und Maßnahmen zu ihrem Schutz. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **9**: 2-12; Beedenbostel.
- MELTER, J. (2001): Siedlungsdichten des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*) in Niedersachsen im Jahre 2000. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **33** (1): 43-53; Goslar.
- MÜTTERLEIN, J. (2001): Das Gagelmoor (Myricetum gale JONAS 1932) im Naturschutzgebiet „Gagelstrauchfläche bei Räderloh“ (Landkreis Gifhorn). - Braunschweiger Naturkundliche Schriften **6** (2): 501-519; Braunschweig.
- NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR ÖKOLOGIE (Hrsg.) (2001): Gewässergütebericht 2000. - Oberirdische Gewässer **13/2001**: 40 S. + Anhang; Hildesheim.
- NIEDERSÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM (2001): Naturparke in Niedersachsen. - 32 S.; Hannover.
- NIEDERSÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM, NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR ÖKOLOGIE (2001): Umweltbericht 2001. Teil 1: Qualität. - 255 S.; Hannover.
- RATHIG, D., GRIMM, R., TIEMANN, H., VAUCK, U. (2001): Bodenzoologischer Vergleich ökologisch und konventionell bewirtschafteter Ackerflächen mit sandigen Böden am Beispiel der Raubmilben (Acarina, Gamasina). - Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz **9** (4): 203-210; Jena.
- REITHER, H. (2001): Kunststoff-Müll bedroht Weißstörche (*Ciconia ciconia*). - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **54** (3/4): 72-78; Peine.
- REITHER, H., REITHER, G. (2001): Weißstorch-Erfassung 2000 im Vergleich mit 1999 im Regierungsbezirk Braunschweig. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **54** (3/4): 79-80; Peine.
- SCHMIDT, F.-U. (2001): Die Vogelwelt im Landkreis Soltau-Fallingbostel. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **7/8**: 358 S.; Soltau.
- SCHUPP, D. (2001): Unzerschnittene verkehrssarme Räume in Niedersachsen - Landesbezogene Auswertung der Erhebung des Bundesamts für Naturschutz. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **21** (1): 64-67; Hildesheim.

- SPELLMANN, H., HILLEBRAND, K., CORNELIUS, P. (2001): Konzept zur Erfassung und Sicherung der Nachhaltigkeit in multifunktional genutzten Wäldern. - Forst und Holz **56** (15): 469-473; Alfeld.
- SPRICK, P., SCHMIDT, L., LOMPE, A., ESSER, J., HAHLBOHM, H.-H., WILLERS, J. (2001): 3. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover. - Braunschweiger Naturkundliche Schriften **6** (2): 309-331; Braunschweig.
- STUKE, J.-H., SCHULZ, W. (2001): Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen 4. - Braunschweiger Naturkundliche Schriften **6** (2): 333-346; Braunschweig.
- THEUNERT, R. (2001): Pflege- und Entwicklungsplan „Niedersächsischer Drömling“ - Schmetterlinge und Bockkäfer. - Ökologieconsult-Schriften **4**: 128 S.; Hohenhameln.
- TORKLER, A. (2001): Die Vogelwelt der Meißendorfer Teiche. - Celler Berichte zur Vogelkunde **7**: 76 S.; Celle.
- VAHLE, H.-C. (2001): Das Konzept der potentiellen Kulturlandschafts-Vegetation. - Tuexenia **21**: 273-292; Göttingen.
- VOLLMER, I., SCHERFOSE, V. (2001): Schutzeffizienz der Naturschutzgroßprojekte des Bundes auf vom Aussterben bedrohte und stark gefährdete Farn- und Blütenpflanzen. - Natur und Landschaft **76** (9/10): 398-405; Stuttgart.
- WÜBBENHORST, J. (2001): Pilze auf Hof Möhr. - Mitteilungen aus der NNA **12** (1): 23-25; Schneverdingen.
- ZANG, H., HECKENROTH, H. (2001): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen - Lerchen bis Braunellen. - Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, Sonderreihe B **2.8**: 260 S.; Hannover.

Herrn Dr. HERBERT REUSCH, Suhlendorf, danke ich für diverse Literaturhinweise.

Anschrift des Verfassers: Dr. Thomas Kaiser, Am Amtshof 18, 29355 Beedenbostel.